

Honorarordnung 2005

C. Spezieller Teil Klautentiere

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|---------|
| | Minimum | Maximum |
| Abdominozentese-Kalb | 11,6 | 20,0 |
| Abdominozentese-kIWk | 8,4 | 23,1 |
| Abdominozentese-Rind | 8,4 | 23,1 |
| Ablegen-Kalb | 4,2 | 7,4 |
| Ablegen-kIWk | 4,2 | 7,4 |
| Ablegen-Rind | 11,6 | 18,9 |
| Abszess-Eröffnung-+-Drainage-beim-Kalb | 6,3 | 15,8 |
| Abszess-Eröffnung-+-Drainage-beim-Rind | 6,3 | 31,5 |
| Abszess-spalten-Kalb | 6,3 | 15,8 |
| Abszess-spalten-kIWk | 6,3 | 15,8 |
| Abszess-spalten-Rind | 6,3 | 31,5 |
| Aderlass-Rind | 13,7 | 15,8 |
| Amputation-der-Zehe-im-Fesselbein-Rind | 57,8 | 78,8 |
| Amputation-der-Zehe-im-Kronbein-Rind | 57,8 | 78,8 |
| Amputation-der-Zehe-Schwein/Schaf | 26,3 | 52,5 |
| androg.Untersuchung-und-SamenUS-kIWk | 189,0 | 262,5 |
| androg.Untersuchung-und-SamenUS-Rind | 189,0 | 262,5 |
| androg.Untersuchung-und-SamenUS-Schwein | 189,0 | 262,5 |
| Arthrotomie+Gelenkspülung | 31,5 | 115,5 |
| Atemnotsyndrom-Kalb | 42,0 | 126,0 |
| Befundbericht-Kalb | 11,6 | 105,0 |
| Befundbericht-kIWk | 11,6 | 105,0 |
| Befundbericht-Rind | 11,6 | 105,0 |
| Befundbericht-Schwein | 5,3 | 105,0 |
| Befund-Drittländer-Export-Samen/E.-kIWk | 126,0 | 126,0 |
| Befund-Drittländer-Export-Samen/E.-Rind | 126,0 | 126,0 |
| Befund-für-EU-Export-Samen/Embryonen-kIWk | 126,0 | 126,0 |
| Befund-für-EU-Export-Samen/Embryonen-Rind | 126,0 | 126,0 |
| Bestandsberatung-(je-Stunde)-Rind | 23,1 | 105,0 |
| Bestandsberatung-(je-Stunde)-Schwein | 42,0 | 105,0 |
| Bestandsberatung-je-Stunde-kIWk | 23,1 | 105,0 |
| Bestandsberatung-Kalb-(je-Stunde) | 23,1 | 105,0 |
| Bestandsuntersuchung-(je-Stunde)-Rind | 23,1 | 105,0 |
| Bestandsuntersuchung-(je-Stunde)-Schwein | 42,0 | 105,0 |
| Bestandsuntersuchung-je-Stunde-kIWk | 23,1 | 105,0 |
| Bestandsuntersuchung-Kalb-(je-Stunde) | 23,1 | 105,0 |
| Blinddarmverlagerung-Kalb | 52,5 | 84,0 |
| Blinddarmverlagerung-kIWk | 52,5 | 84,0 |
| Blinddarmverlagerung-Rind | 126,0 | 168,0 |
| Blutgasanalyse-Kalb | 8,4 | 11,6 |
| Blutgasanalyse-kIWk | 8,4 | 11,6 |
| Blutgasanalyse-Rind | 8,4 | 11,6 |
| Blutgasanalyse-Schwein | 8,4 | 11,6 |
| Bluttransfusion-Kalb | 15,8 | 30,5 |
| Bluttransfusion-kIWk | 15,8 | 30,5 |
| Bluttransfusion-Rind | 23,1 | 53,6 |
| Bursitis-Operation:-Eröffnung-+-Drainage | 21,0 | 31,5 |
| Bursitis-peritarsalis-Totalresektion | 37,8 | 76,7 |
| Bursitis-praecarpalis-Totalresektion | 37,8 | 76,7 |
| chirurg.Versorgung-Dammriss | 52,5 | 105,0 |
| chirurg.Versorgung-Dammriss-kIWk | 52,5 | 105,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|---------|
| | Minimum | Maximum |
| chirurg.Versorgung-Dammriss-Rind | 126,0 | 252,0 |
| chirurg.Versorgung-Geburtsverletzungen-kIWk | 52,5 | 105,0 |
| chirurg.Versorgung-Geburtsverletzungen-Rind | 84,0 | 126,0 |
| chirurg.Versorgung-Geburtsverletzungen-Schwein | 52,5 | 105,0 |
| CT-Bullae-Klauentier-(ohne-Kontrast) | 78,8 | 262,5 |
| CT-Cranium-Klauentier-(ohne-Kontrast) | 105,0 | 472,5 |
| CT-Gelenk-vgl.-Klauentier-(ohne-Kontrast) | 105,0 | 472,5 |
| CT-Hypophyse-Klauentier-(ohne-Kontrast) | 78,8 | 262,5 |
| CT-Kontrastmittel-Klauentier | 52,5 | 315,0 |
| CT-Nachkontrolle-Klauentier | 42,0 | 157,5 |
| CT-Narkose/Tier-Klauentier | 21,0 | 157,5 |
| CT-Nasen-/Nebenhöhlen-Klauentier-(ohne-Kontrast) | 105,0 | 472,5 |
| CT-Obere-Halsgegend-Klauentier-(ohne-Kontrast) | 105,0 | 472,5 |
| CT-Wirbelsäule-Klauentier-(ein-Abschnitt,-ohne-Kontrast) | 105,0 | 472,5 |
| CT-Wirbelsäule-Klauentier-(weiterer-Abschnitt,-ohne-Kontrast) | 52,5 | 157,5 |
| Darmresektion | 63,0 | 115,5 |
| Darmresektion-Kalb | 63,0 | 115,5 |
| Darmresektion-Rind | 157,5 | 315,0 |
| Dauertropfinfusion-(ohne-Medikamente)-kIWk | 11,6 | 23,1 |
| Dauertropfinfusion-(ohne-Medikamente)-Rind | 11,6 | 23,1 |
| Dauertropfinfusion-(ohne-Medikamente)-Schwein | 10,5 | 21,0 |
| Dauertropfinfusion-Kalb-(ohne-Medikamente) | 11,6 | 23,1 |
| Dermatitis-interdigitalis-/digitalis-OP | 21,0 | 36,8 |
| Desmotomie-des-medialen-Patellabandes | 73,5 | 99,8 |
| Ejakulat-Untersuchung-Frischsperma-kIWk | 157,5 | 157,5 |
| Ejakulat-Untersuchung-Frischsperma-Rind | 157,5 | 157,5 |
| Ejakulat-Untersuchung-Frischsperma-Schwein | 157,5 | 157,5 |
| Ejakulat-Untersuchung-Tiefgefriersperma-kIWk | 210,0 | 262,5 |
| Ejakulat-Untersuchung-Tiefgefriersp-Rind | 210,0 | 262,5 |
| EKG-Kalb | 15,8 | 31,5 |
| EKG-kIWk | 15,8 | 31,5 |
| EKG-Rind | 23,1 | 42,0 |
| Endometritis,-ggr.--Rind | 36,8 | 157,5 |
| Endometritis,-ggr.--Schwein | 21,0 | 84,0 |
| Endoskopie-Harnblase-Kalb | 30,5 | 30,5 |
| Endoskopie-Harnblase-kIWk | 30,5 | 30,5 |
| Endoskopie-Harnblase-Rind | 37,8 | 37,8 |
| Endoskopie-Respirationstrakt-Kalb | 20,0 | 20,0 |
| Endoskopie-Respirationstrakt-kIWk | 20,0 | 20,0 |
| Endoskopie-Respirationstrakt-Rind | 31,5 | 31,5 |
| Endoskopie-Schlund-Kalb | 20,0 | 20,0 |
| Endoskopie-Schlund-kIWk | 20,0 | 20,0 |
| Endoskopie-Schlund-Rind | 23,1 | 23,1 |
| Endoskopie-Zitze-(lateraler-Zugang)-Rind | 63,0 | 63,0 |
| Endoskopie-Zitze-(Strichkanal)-kIWk | 23,1 | 23,1 |
| Endoskopie-Zitze-(Strichkanal)-Rind | 32,6 | 32,6 |
| Endoskopische-Biopatentnahme-Kalb | 23,1 | 23,1 |
| Endoskopische-Biopatentnahme-kIWk | 23,1 | 23,1 |
| Endoskopische-Biopatentnahme-Rind | 23,1 | 23,1 |
| Entfernung-FK-Kalb | 15,8 | 46,2 |
| Entfernung-FK-kIWk | 15,8 | 46,2 |
| Entfernung-FK-Rind | 23,1 | 63,0 |
| Enthornen-Kalb | 7,4 | 23,1 |
| Enthornen-kIWk | 7,4 | 23,1 |
| Enthornen-Rind | 7,4 | 23,1 |
| Enthornen-und--Duftdrüsenentfernung | 31,5 | 42,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|---------|
| | Minimum | Maximum |
| Enukleation-Kalb | 46,2 | 63,0 |
| Enukleation-Rind | 63,0 | 115,5 |
| Enukleation-kIWk | 46,2 | 63,0 |
| Euterbiopsie-kIWk | 15,8 | 31,5 |
| Euterbiopsie-Rind | 15,8 | 31,5 |
| Euthanasie-Kalb | 15,8 | 23,1 |
| Euthanasie-kIWk | 15,8 | 23,1 |
| Euthanasie-Rind | 23,1 | 36,8 |
| Euthanasie-Schwein | 3,2 | 42,0 |
| Exartikulation-der-Zehe-im-Krongelenk-Rind | 57,8 | 78,8 |
| Exartikulation-im-Krongelenk-Schwein/Schaf | 26,3 | 52,5 |
| Fesselgelenk-Rö | 80,1 | 114,5 |
| Festliegen | 45,8 | 91,6 |
| Fistel | 15,8 | 46,2 |
| Fistel-Kalb | 15,8 | 31,5 |
| Fistel-kIWk | 15,8 | 31,5 |
| FK---Operation,-Rumenotomie-Kalb | 42,0 | 63,0 |
| FK---Operation,-Rumenotomie-kIWk | 42,0 | 63,0 |
| FK---Operation,-Rumenotomie-Rind | 126,0 | 157,5 |
| Follikelkontrolle | 18,9 | 18,9 |
| Follikelpunktion-In-Vitro-Fertilisierung | 525,0 | 787,5 |
| Geburtshilfe,-Fetotomie | 210,0 | 420,0 |
| Geburtshilfe,-Sectio-kIWdk | 126,0 | 252,0 |
| Geburtshilfe,-Sectio-Rind | 210,0 | 420,0 |
| Geburtshilfe,-Sectio-Schwein | 126,0 | 252,0 |
| Geburtshilfe,-vaginale-Geburt-kIWdk | 31,5 | 94,5 |
| Geburtshilfe,-vaginale-Geburt-Rind | 42,0 | 126,0 |
| Geburtshilfe,-vaginale-Geburt-Schwein | 31,5 | 94,5 |
| Gelenkspülung-Rind | 11,6 | 52,5 |
| Gelenkspunktion | 11,6 | 23,1 |
| Gutachten-Kalb | 62,0 | 357,0 |
| Gutachten-kIWk | 62,0 | 357,0 |
| Gutachten-Rind | 76,7 | 535,5 |
| Gutachten-Schwein | 52,5 | 420,0 |
| Harnkatheter-weiblich-Rind | 8,4 | 10,5 |
| Harnkatheter-weiblich-Schwein | 5,3 | 10,5 |
| Hautbiopsie-Kalb | 15,8 | 31,5 |
| Hautbiopsie-kIWk | 15,8 | 31,5 |
| Hautbiopsie--Rind | 15,8 | 31,5 |
| Hautbiopsie-Schwein | 7,4 | 31,5 |
| Hautgeschabsel-Kalb | 7,4 | 11,6 |
| Hautgeschabsel-kIWk | 7,4 | 11,6 |
| Hautgeschabsel--Rind | 7,4 | 11,6 |
| Hautgeschabsel-Schwein | 5,3 | 10,5 |
| Hodenbruch,-Leistenbruch | 16,8 | 26,3 |
| Holzstöckel-/Cowslip-/Easy-Bloc-kleben | 12,6 | 16,8 |
| Holzstöckel-kleben+-Fixierung-Nachbarklaue | 14,7 | 16,8 |
| Hormonelle-Zyklus-oder-Ovulationsind-kIWdk | 31,5 | 105,0 |
| Hormonelle-Zyklus-oder-Ovulationsind--Rind | 31,5 | 105,0 |
| Hormonelle-Zyklus-oder-Ovulationsind-Schwein | 31,5 | 105,0 |
| Indigestion-kIWk | 15,3 | 30,5 |
| Indigestion-Rind | 30,5 | 45,8 |
| Infektiöse-Interdigitalnekrose-OP | 31,5 | 60,9 |
| Infiltrationsanästhesie | 10,5 | 15,8 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|---------|
| | Minimum | Maximum |
| Injektion-extradural,-Liquorpunktion-Kalb | 15,2 | 22,9 |
| Injektion-extradural,-Liquorpunktion-kIWk | 15,2 | 22,9 |
| Injektion-extradural,-Liquorpunktion-Rind | 15,2 | 22,9 |
| Injektion-extradural,-Liquorpunktion-Schwein | 3,2 | 15,8 |
| Injektion-i.v.,-Blutabnahme-Kalb | 5,4 | 11,6 |
| Injektion-i.v.,-Blutabnahme-Rind | 5,4 | 11,6 |
| Injektion-i.v.,-Blutabnahme-Schwein | 3,2 | 8,4 |
| Injektion-i.v.,Blutentnahme-kIWk | 5,4 | 11,6 |
| Injektion-intraartikulär | 11,6 | 23,1 |
| Injektion-s.k.,-i.m.,-i.k.-Kalb | 2,3 | 4,6 |
| Injektion-s.k.,i.m.,i.k.-kIWk | 2,3 | 4,6 |
| Injektion-s.k.,-i.m.,-i.k.-Rind | 3,9 | 6,1 |
| Injektion-s.k.,-i.m.,-i.k.-Schwein | 2,1 | 5,3 |
| Intensivtherapie-Neonaten-Asphyxie-kIWdk | 31,5 | 94,5 |
| Intensivtherapie-Neonaten-Asphyxie-Rind | 42,0 | 126,0 |
| Intramammäre-Instillation-kIWk | 4,2 | 8,4 |
| Intramammäre-Instillation-Rind | 4,2 | 11,6 |
| Intraperitoneale-Injektion-kIWk | 8,4 | 11,6 |
| Intraperitoneale-Injektion-Kalb | 8,4 | 11,6 |
| Intraperitoneale-Injektion-Rind | 8,4 | 11,6 |
| Intraperitoneale-Injektion-Schwein | 1,1 | 5,3 |
| Intravenöse-Stauungsanästhesie | 23,1 | 23,1 |
| Intravenöse-Stauungsanästhesie-inkl.-AB | 16,8 | 34,7 |
| In-Vitro-Fertilisierung-nach-Schlachtung | 315,0 | 525,0 |
| Kastration-Kalb | 23,1 | 42,0 |
| Kastration-kIWk | 23,1 | 42,0 |
| Kastration-Rind | 23,1 | 46,2 |
| Kastration-Schwein | 4,2 | 42,0 |
| Klauenoperation-beim-Schwein | 10,5 | 31,5 |
| Klauenpflege-bei-Schaf/-Ziege | 4,2 | 8,4 |
| Klauenpflege-Funktionell-beim-Rind | 11,6 | 23,1 |
| Klauenpflege-Schwein | 7,4 | 22,1 |
| Klauensohlengeschwür-OP | 21,0 | 52,5 |
| Klauenspitzeneschwür-OP | 21,0 | 31,5 |
| Klauenspitzenekrose-OP | 36,8 | 52,5 |
| Klinische-Untersuchung-Aufnahme-Kalb | 15,0 | 15,0 |
| Klinische-Untersuchung-Aufnahme-Kalb-Notdienst | 23,0 | 23,0 |
| klinische-Untersuchung-Aufnahme-kIWk | 20,0 | 20,0 |
| klinische-Untersuchung-Aufnahme-kIWk-Notdienst | 28,0 | 28,0 |
| Klinische-Untersuchung-Aufnahme-Rind | 30,0 | 30,0 |
| Klinische-Untersuchung-Aufnahme-Rind-Notdienst | 42,0 | 42,0 |
| Klinische-Untersuchung-Aufnahme-Schwein | 5,0 | 16,0 |
| Klinische-Untersuchung-Aufnahme-Schwein-Notdienst | 7,0 | 22,0 |
| Kniegelenke-Rö | 83,9 | 106,8 |
| Knochenaktinomykose-Rind | 46,2 | 115,5 |
| Knochenaktionomykose-Kalb | 15,8 | 63,0 |
| Kryptorchidenoperation | 21,0 | 31,5 |
| Kurze-Bescheinigung-(Diagnose)-Kalb | 5,3 | 15,8 |
| Kurze-Bescheinigung-(Diagnose)-kIWk | 5,3 | 15,8 |
| Kurze-Bescheinigung-(Diagnose)-Rind | 5,3 | 15,8 |
| Kurze-Bescheinigung-(Diagnose)-Schwein | 5,3 | 15,8 |
| Labmagenverlagerung-Kalb | 42,0 | 76,7 |
| Labmagenverlagerung-kIWk | 42,0 | 76,7 |
| Labmagenverlagerung-Rind | 126,0 | 168,0 |
| Laparoskopie-Kalb | 42,0 | 42,0 |
| Laparoskopie-kIWk | 42,0 | 42,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|---------|
| | Minimum | Maximum |
| Laparoskopie-Rind | 63,0 | 63,0 |
| Laparotomie-Kalb | 31,5 | 46,2 |
| Laparotomie-kIWk | 31,5 | 46,2 |
| Laparotomie-Rind | 63,0 | 76,7 |
| Leberbiopsie-Kalb | 23,1 | 23,1 |
| Leberbiopsie-kIWk | 23,1 | 23,1 |
| Leberbiopsie-Rind | 23,1 | 23,1 |
| Leitungsanästhesie-am-Rohrbein | 11,6 | 11,6 |
| Limax-Operation | 31,5 | 52,5 |
| Lokalanästhesie-Kalb | 4,2 | 15,8 |
| Lokalanästhesie-kIWk | 4,2 | 15,8 |
| Lokalanästhesie-Rind | 15,8 | 31,5 |
| Lokalanästhesie-Schwein | 3,2 | 15,8 |
| Magenschlundsonde-Kalb | 7,7 | 8,4 |
| Magenschlundsonde-kIWk | 7,7 | 8,4 |
| Magenschlundsonde-Rind | 7,7 | 8,4 |
| Magenschlundsonde-Schwein | 7,4 | 14,7 |
| medikamentelle-Geburts-/Abortseinleitung-kIWk | 36,8 | 36,8 |
| medikamentelle-Geburts-/Abortseinleitung-Rind | 36,8 | 36,8 |
| medikamentelle-Geburts-/Abortseinleitung-Schwein | 36,8 | 36,8 |
| Medikation-per-os-Kalb | 3,0 | 3,0 |
| Medikation-per-os-kIWk | 3,0 | 3,0 |
| Medikation-per-os-Rind | 3,9 | 3,9 |
| Medikation-per-os-Schwein | 0,5 | 4,2 |
| Milchprobe-kIWk | 6,3 | 10,5 |
| Milchprobe-Rind | 6,3 | 10,5 |
| Milchprobe-Schwein | 6,3 | 15,8 |
| MRI-Bullae-Klautier-(ohne-Kontrast) | 78,8 | 367,5 |
| MRI-Cranium-Klautier-(ohne-Kontrast) | 105,0 | 472,5 |
| MRI-Gelenk-vgl.-Klautier-(ohne-Kontrast) | 105,0 | 472,5 |
| MRI-Hypophyse-Klautier-(ohne-Kontrast) | 78,8 | 367,5 |
| MRI-Kontrastmittel-Klautier | 52,5 | 315,0 |
| MRI-Nachkontrolle-Klautier | 42,0 | 157,5 |
| MRI-Narkose/Tier-Klautier | 21,0 | 157,5 |
| MRI-Nasen-/Nebenhöhlen-Klautier-(ohne-Kontrast) | 105,0 | 472,5 |
| MRI-Obere-Halsgegend-Klautier-(ohne-Kontrast) | 105,0 | 472,5 |
| MRI-Wirbelsäule-Klautier-(ein-Abschnitt,-ohne-Kontrast) | 105,0 | 472,5 |
| MRI-Wirbelsäule-Klautier-(weitere-Abschnitte,-ohne-Kontrast) | 52,5 | 157,5 |
| Nabelbruch-Kalb | 54,6 | 78,8 |
| Nabelbruch-Schwein | 21,0 | 31,5 |
| Narkose-Kalb | 15,8 | 31,5 |
| Narkose-kIWk | 15,8 | 31,5 |
| Narkose-Rind | 15,8 | 46,2 |
| Narkose-Schwein | 3,2 | 52,5 |
| Nasenring-einziehen | 8,4 | 15,8 |
| Nasenschlundsonde-Rind | 7,7 | 15,3 |
| Nebenhöhlen-des-Kopfes-Röntgen | 53,4 | 57,2 |
| Neoplasma-Kalb | 15,8 | 46,2 |
| Neoplasma-kIWk | 15,8 | 46,2 |
| Neoplasma-Rind | 23,1 | 57,8 |
| Neurologische-Untersuchung-Kalb | 23,1 | 31,5 |
| Neurologische-Untersuchung-kIWk | 23,1 | 31,5 |
| Neurologische-Untersuchung-Rind | 23,1 | 38,9 |
| Neurologische-Untersuchung-Schwein | 3,2 | 21,0 |
| Obere-Halsgegend-u.-Nebenhöhlen-Rö | 76,3 | 114,5 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|---------|
| | Minimum | Maximum |
| Operation-am-Penis/Präputium-KlWdk | 84,0 | 168,0 |
| Operation-am-Penis/Präputium-Rind | 126,0 | 262,5 |
| Operation-am-Penis/Präputium-Schwein | 84,0 | 168,0 |
| Operation-Ovartumor | 157,5 | 315,0 |
| Orthopädische-Untersuchung | 23,1 | 46,2 |
| Osteosynthese-Lange-Röhrenknochen-Rind | 157,5 | 525,0 |
| Osteosynthese-Lange-Röhrenknochen-Schaf/Ziege | 105,0 | 367,5 |
| Pseudotuberkulose-KlWk | 15,8 | 63,0 |
| puerperale-Infektion/Intoxikation-KlWdk | 63,0 | 126,0 |
| puerperale-Infektion/Intoxikation-Rind | 84,0 | 168,0 |
| puerperale-Infektion/Intoxikation-Schwein | 63,0 | 126,0 |
| Punktion-Kalb | 8,4 | 8,4 |
| Punktion-KlWk | 8,4 | 8,4 |
| Punktion-Rind | 8,4 | 15,8 |
| Punktion-Schwein | 3,2 | 7,4 |
| Pyometra-KlWdk | 78,8 | 126,0 |
| Pyometra-Rind | 126,0 | 252,0 |
| Pyometra-Schwein | 78,8 | 126,0 |
| Rektale,-digitale-Untersuchung-Kalb | 7,9 | 11,6 |
| Rektale,-digitale-Untersuchung-KlWk | 7,9 | 11,6 |
| Rektale,-digitale-Untersuchung-Rind | 7,9 | 18,9 |
| Rektale,-digitale-Untersuchung-Schwein | 15,8 | 15,8 |
| Rektumprolaps-Kalb | 15,8 | 31,5 |
| Rektumprolaps-KlWk | 15,8 | 31,5 |
| Rektumprolaps-Rind | 15,8 | 31,5 |
| Rektumprolaps-Schwein | 11,6 | 23,1 |
| Reposition-Scheiden-oder-Uterusprolaps-KlWdk | 42,0 | 84,0 |
| Reposition-Scheiden-oder-Uterusprolaps-Rind | 105,0 | 210,0 |
| Reposition-Scheiden-oder-Uterusprolaps-Schwein | 42,0 | 84,0 |
| Resektion-der-tiefen-Beugesehne-am-Ansatz | 52,5 | 63,0 |
| Resektion-des-Klauengelenkes-mit-Bohrer | 52,5 | 105,0 |
| Resektion-tiefe-Beugesehne-am-Ansatz-inkl.-Sesambein | 52,5 | 99,8 |
| Resektion-total-der-OBS-und-TBS | 52,5 | 105,0 |
| Resektion-v.-Knochensequestern/Fisteln | 42,0 | 115,5 |
| Retentio-sec. | 42,0 | 84,0 |
| Rö-Fistelographie-Klautentier-(ohne-Grundtarif) | 45,2 | 74,0 |
| Rö-Kontrast-Schluckakt-Klautentier-(ohne-Grundtarif) | 45,2 | 74,0 |
| Rö-Myelographie-Klautentier-(ohne-Grundtarif) | 75,6 | 152,3 |
| Rö-Nachkontrolle-Klautentier | 21,0 | 52,5 |
| Röntgen-Obere-Halsgegend | 29,0 | 32,0 |
| Röntgenuntersuchung-/Einzelaufnahme | 11,6 | 34,7 |
| RÖ-US-Grundtarif-(Aufnahme+-Befund) | 26,3 | 84,0 |
| Rö-US-Grundtarif-(Aufnahme+-Befund)-Klautentier | 26,3 | 84,0 |
| Rö-US-Zuschlag-für-weitere-Aufnahmen-Klautentier | 10,5 | 42,0 |
| Sameneinführung-(inkl.-Kosten-für-Samen) | 21,0 | 105,0 |
| Saug-Drainage-(Redon-Drain) | 31,5 | 31,5 |
| Schwanzamputation-Kalb | 23,1 | 42,0 |
| Schwanzamputation-KlWk | 23,1 | 42,0 |
| Schwanzamputation-Rind | 42,0 | 46,2 |
| Sedierung-Kalb | 4,2 | 8,4 |
| Sedierung-KlWk | 4,2 | 8,4 |
| Sedierung-Rind | 8,4 | 15,8 |
| Sedierung-Schwein | 3,2 | 21,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|---------|
| | Minimum | Maximum |
| Sehnenscheiden-OP:- Eröffnung+Spülung | 31,5 | 78,8 |
| Spastische-Parese-OP-Neurektomie | 157,5 | 315,0 |
| Spermiogramm-kIWdk | 42,0 | 42,0 |
| Spermiogramm-Rind | 42,0 | 42,0 |
| Spermiogramm-Schwein | 42,0 | 42,0 |
| spez.Andrologie-all-inkl.-kIWdk | 525,0 | 787,5 |
| spez.Andrologie-all-inkl.-Rind | 525,0 | 787,5 |
| Spez.gynäkolog.Untersuchung-kIWdk | 21,0 | 42,0 |
| spez.gynäkolog.Untersuchung-Rind | 31,5 | 63,0 |
| Spez.-gynäkolog.-Untersuchung-Schwein | 21,0 | 42,0 |
| Sprunggelenk-Rö | 106,8 | 137,4 |
| Standard-Labordiagnostik-Blut-Kalb | 20,0 | 31,5 |
| Standard-Labordiagnostik-Blut-kIWk | 20,0 | 31,5 |
| Standard-Labordiagnostik-Blut-Rind | 20,0 | 46,2 |
| Standard-Labordiagnostik-Blut-Schwein | 10,5 | 31,5 |
| Superovulation-Embryonenspülung-kIWdk | 288,8 | 525,0 |
| Superovulation-Embryonenspülung-Rind | 288,8 | 288,8 |
| Synchronisation-Embryonenübertragung-kIWdk | 105,0 | 105,0 |
| Synchronisation-Embryonenübertragung-Rind | 157,5 | 157,5 |
| Tagesgebühr-Kalb | 2,3 | 2,3 |
| Tagesgebühr-kIWk | 2,3 | 2,3 |
| Tagesgebühr-Rind | 4,2 | 4,2 |
| Tagesgebühr-Schwein | 1,1 | 3,2 |
| Theloresektoskopie-Kalb | 42,0 | 42,0 |
| Theloresektoskopie-kIWk | 42,0 | 42,0 |
| Theloresektoskopie-Rind | 69,3 | 69,3 |
| Thorakozentese-Kalb | 15,8 | 31,5 |
| Thorakozentese-kIWk | 15,8 | 31,5 |
| Thorakozentese-Rind | 15,8 | 31,5 |
| Thorax-Röntgen | 45,8 | 57,2 |
| Tiefgefrierkonservierung-v.-Embryonen-kIWdk | 84,0 | 84,0 |
| Tiefgefrierkonservierung-v.-Embryonen-Rind | 84,0 | 84,0 |
| Tracheotomie-Kalb | 31,5 | 46,2 |
| Tracheotomie-kIWk | 31,5 | 46,2 |
| Tracheotomie-Rind | 31,5 | 63,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung-Bestand-Rind | 4,2 | 10,5 |
| Trächtigkeitsuntersuchung-Bestand-Schwein | 4,2 | 10,5 |
| Trächtigkeitsuntersuchung-kIWk | 15,8 | 15,8 |
| Trächtigkeitsuntersuchung-Rind | 21,0 | 21,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung-Schwein | 15,8 | 15,8 |
| Trächtigkeitsuntersuchung-Serie-kIWk | 5,3 | 21,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung-Serie-Rind | 5,3 | 21,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung-Serie-Schwein | 5,3 | 21,0 |
| Tumor-OP-an-Gliedmaße-(Resektion) | 42,0 | 115,5 |
| Tupferprobe-Kalb-(Nase,-Kot,-Konjunktiva) | 11,6 | 11,6 |
| Tupferproben-kIWk-(Nase,-Kot,-Konjunktiva) | 11,6 | 11,6 |
| Tupferprobe-Rind-(Nase,-Kot,-Konjunktiva) | 11,6 | 11,6 |
| Tupferprobe-Schwein-(Nase,-Kot,-Konjunktiva) | 5,3 | 10,5 |
| Tympanie,-Schlundverstopfung-Kalb | 15,8 | 31,5 |
| Tympanie,-Schlundverstopfung-kIWk | 15,8 | 31,5 |
| Tympanie,-Schlundverstopfung-Rind | 26,3 | 42,0 |
| Ultraschall-Abdomen-Kalb | 15,8 | 31,5 |
| Ultraschall-Abdomen-kIWk | 15,8 | 31,5 |
| Ultraschall-Abdomen-Rind | 23,1 | 42,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|---------|
| | Minimum | Maximum |
| Ultraschall-geführte-Biopsie-/Punktion-Kalb | 31,5 | 46,2 |
| Ultraschall-geführte-Biopsie/Punktion-kIWk | 31,5 | 46,2 |
| Ultraschall-geführte-Biopsie-/Punktion-Rind | 42,0 | 54,6 |
| Ultraschall-Herz-Kalb | 23,1 | 46,2 |
| Ultraschall-Herz-kIWk | 23,1 | 46,2 |
| Ultraschall-Herz-Rind | 31,5 | 63,0 |
| Ultraschall-Untersuchung-Kalb | 10,5 | 42,0 |
| Ultraschall-Untersuchung-Rind | 15,8 | 60,9 |
| Ultraschall-Weichteile-Kalb | 15,8 | 31,5 |
| Ultraschall-Weichteile-kIWk | 15,8 | 31,5 |
| Ultraschall-Weichteile-Rind | 23,1 | 42,0 |
| Urethrotomie-Kalb | 21,0 | 46,2 |
| Urethrotomie-kIWk | 21,0 | 46,2 |
| Urethrotomie-Rind | 31,5 | 78,8 |
| US-Abdomen-Klautier | 21,0 | 47,3 |
| US-Auge-Klautier | 26,3 | 63,0 |
| US-Gelenke,-Sehnen-Klautier | 26,3 | 84,0 |
| US-Herz-Klautier | 31,5 | 63,0 |
| US-mit-besonderen-Verfahren-Kalb | 5,3 | 23,1 |
| US-mit-besonderen-Verfahren-kIWk | 5,3 | 23,1 |
| US-mit-besonderen-Verfahren-Rind | 5,3 | 23,1 |
| US-mit-besonderen-Verfahren-Schwein | 5,3 | 23,1 |
| US-Nachkontrolle-Klautier | 21,0 | 52,5 |
| US-oberflächliche-Strukturen,-Weichteile-Klautier | 26,3 | 84,0 |
| Uterusbiopsie | 21,0 | 42,0 |
| Uterusretorsion-kIWk | 73,5 | 147,0 |
| Uterusretorsion-Rind | 73,5 | 147,0 |
| Verband-an-Klaue | 11,6 | 21,0 |
| Verband-an-Rohrbein-/Karpus-/Tarsus | 11,6 | 37,8 |
| Verband-kleiner-Schutzverband | 5,3 | 7,4 |
| Vorderzehen-mit-Fesselgelenk | 129,7 | 183,1 |
| Vorderzehen-Rö | 80,1 | 110,6 |
| White-line-Disease-OP+-Totalwandresektion | 23,1 | 52,5 |
| White-line-Disease-OP-oberflächlich | 21,0 | 52,5 |
| Wundversorgung-Kalb | 26,3 | 52,5 |
| Wundversorgung-kIWk | 26,3 | 52,5 |
| Wundversorgung-mit-Naht | 31,5 | 78,8 |
| Wundversorgung-ohne-Naht | 21,0 | 42,0 |
| Wundversorgung-Rind | 26,3 | 63,0 |
| Wundversorgung-Schwein | 5,3 | 42,0 |
| Zervixtupfer-kIWk | 15,8 | 15,8 |
| Zervixtupfer-Rind | 15,8 | 15,8 |
| Zervixtupfer-Schwein | 15,8 | 15,8 |
| Zitzenamputation-Afterzitze | 42,0 | 52,5 |
| Zitzenamputation-kIWk | 15,8 | 42,0 |
| Zitzenamputation-mit-Stumpferschluß | 52,5 | 63,0 |
| Zitzenamputation-offen | 21,0 | 31,5 |
| Zitzenverletzung-nicht-perforierend-kIWk | 11,6 | 23,1 |
| Zitzenverletzung-nicht-perforierend-Rind | 15,8 | 46,2 |
| Zitzenverletzung-perforierend-kIWk | 15,8 | 31,5 |
| Zitzenverletzung-perforierend-Rind | 57,8 | 73,5 |
| Zyklus-und-Ovulationsstörungen-kIWk | 31,5 | 157,5 |
| Zyklus-und-Ovulationsstörungen-Rind | 31,5 | 157,5 |
| Zyklus-und-Ovulationsstörungen-Schwein | 31,5 | 157,5 |